




*يمكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:
8 – 10.5 كجم
أو
17.5 - 23.1 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
الجرعة لطفلك هي 80 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:
2 مل

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 80 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:
4 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

*إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

/طلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:
10.6 – 15.9 كجم
أو
23.2 - 35.1 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟


قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 100 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:
5 مل



5 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

*إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:
16 – 20.9 كجم
أو
35.2 - 46.1 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 150 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:

7.5 مل

7.5 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:
21 – 26.9 كجم
أو
46.2 - 59.3 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 200 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:
10 مل

10 مل

*يمكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:
27 – 31.9 كجم
أو
59.4 - 70.3 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 250 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:

12.5 مل

12.5 مل

*ممکن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايبوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:

32 – 40 كجم

أو

70.4 - 88.2 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل

لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل

الجرعة لطفلك هي 300 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:

15 مل

15 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

طلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية

ايوبروفين
Ibuprofen
(موترين Motrin)

الوزن:

اكثر من 40 كجم
أو
اكثر من 88.3 رطل

ما هو الدواء
الذي لديك؟

قطرات مركزة للرضع

50 ملغ في 1.25 مل
لا ينصح به

سائل الأطفال

100 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 400 ملغ

استخدم الحقنة للقياس:

20 مل

20 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات.

*يؤخذ مع الطعام.

* لا تستخدمه في حالة الجفاف.

* لا يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* يمكنك تناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

*إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

طلب الحقنة المدرجة لضبط الجرعة من قسم الطوارئ أو الصيدلية