






Commented [BJA1]: No edits needed to show missing text






*قد يستغرق كل 4 إلى 6 ساعات.

* لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية







*ممكّن أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.




* لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

اطلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية








***يمكن أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.**

* **لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).**

* **يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).**

* **إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.**

*****طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية*****






***يمكن أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.**

* **لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).**

* **يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).**

* **إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.**

*****طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية*****






***ممكّن** أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.

* **لا** تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* **يمكنك** تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

*****طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية*****






***يمكن أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.**

* **لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).**

* **يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).**

* **إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.**

*****طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية*****



***ممكّن** أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.

* **لا** تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* **يمكنك** تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).


* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

*****طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية*****

الوزن:
أكثر من 40 كجم
أو
أكثر من 88.3 رطل

أسيتامينوفين
Acetaminophen
(تايلينول Tylenol)

سائل الأطفال
160 ملغ في 5 مل
الجرعة لطفلك هي 640 ملغ



استخدم حقنة للقياس:
20 مل

*ممكن أن يؤخذ كل 4 إلى 6 ساعات.

* لا تتناوله مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأسيتامينوفين (تايلينول).

* يمكنك تناول هذا مع المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأيبوبروفين (موترين).

* إذا تجاوز طفلك نطاق الوزن هذا، استشر طبيبك للحصول على جرعة جديدة.

/طلب حقنة الجرعات من قسم الطوارئ أو الصيدلية