


Peso:
5 – 7,9kg
OU
11 - 17,4

Ibuprofeno
(Motrin)


Qual
medicam
ento
voçê

Gotas Concentradas para Bebês
50mg em 1,25mL
A dose para seu filho/sua filha é 50mg

Líquido Infantil
100mg em 5mL
A dose para seu filho/sua filha é 50mg



Use uma seringa para medir:
1.25 mL



Use uma seringa para medir:
2.5 mL

***Pode tomar em cada 6 a 8 horas.**
***Tomar com comida.**
*** NÃO use se estiver desidratado.**
***NÃO tome isto com outros produtos que contenham ibuprofeno (Motrin).**
***Você PODE tomar esse medicamento com outros produtos que contenham paracetamol (Tylenol).**
***Se seu filho/sua filha ultrapassar essa faixa de peso, consulte o seu médico para obter uma nova dose.**

*****Peça uma seringa doseadora no pronto-socorro ou farmácia*****

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Peso:
8 – 10,5kg
OU
17.5 - 23,1

**Ibuprofeno
(Motrin)**


**Qual
medicam
ento
você**

Gotas Concentradas para Bebês
50mg em 1,25mL
A dose para seu filho/sua filha é 80mg

Líquido Infantil
100mg em 5mL
A dose para seu filho/sua filha é 80mg

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt




Use uma seringa para medir:
2 mL

Use uma seringa para medir:
4 mL

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt



*Pode tomar em cada 6 a 8 horas.

Formatted: Font: 12 pt

*Tomar com comida.


* NÃO use se estiver desidratado.

*NÃO tome isto com outros produtos que contenham ibuprofeno (Motrin).

*Você PODE tomar esse medicamento com outros produtos que contenham paracetamol (Tylenol).

*Se seu filho/sua filha ultrapassar essa faixa de peso, consulte o seu médico para obter uma nova dose.

Peça uma seringa doseadora no pronto-socorro ou farmácia



Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Peso:
16 – 20,9kg
OU
35.2 - 46,1

**Ibuprofeno
(Motrin)**


**Qual
medicam
ento
você**

Gotas Concentradas para Bebês
50mg em 1,25mL
NÃO Recomendado

Líquido Infantil
100mg em 5mL
A dose para seu filho/sua filha é 150mg

Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt

Use uma seringa para medir:
7.5 mL



Formatted: Font: 12 pt

*Pode tomar em cada 6 a 8 horas.
*Tomar com comida.
* NÃO use se estiver desidratado.
*NÃO tome isto com outros produtos que contenham ibuprofeno (Motrin).
*Você PODE tomar esse medicamento com outros produtos que contenham paracetamol (Tylenol).
*Se seu filho/sua filha ultrapassar essa faixa de peso, consulte o seu médico para obter uma nova dose.

Peça uma seringa doseadora no pronto-socorro ou farmácia

Formatted: Font: 12 pt

Peso:

21 – 26,9kg

OU

46.2 - 59,3

**Ibuprofeno
(Motrin)**

**Qual
medicam
ento
você**

Gotas Concentradas para Bebês

50mg em 1,25mL

NÃO Recomendado

Líquido Infantil

100mg em 5mL

A dose para o seu filho/sua filha é

Use uma seringa para medir:

10 mL



10 mL

***Pode** tomar em cada 6 a 8 horas.

***Tomar** com comida.

*** NÃO** use se estiver desidratado.

***NÃO** tome isto com outros produtos que contenham ibuprofeno (Motrin).

***Você PODE** tomar esse medicamento com outros produtos que contenham paracetamol (Tylenol).

***Se seu filho/sua filha ultrapassar essa faixa de peso, consulte o seu médico para obter uma nova dose.**


*****Peça uma seringa doseadora no pronto-socorro ou farmácia*****

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt




Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt




Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt



Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt