

體重：

5 – 7.9 公斤

或者

11 – 17.4 磅

布洛芬 (Ibuprofen)
(Motrin)

Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt

你有什麼
藥？

濃縮嬰兒滴劑

1.25 毫升中含 50 毫克

給您孩子的劑量是 50 毫克

小兒藥液

5 毫升中含 100 毫克

給您孩子的劑量是 50 毫克

使用注射器測量：

1.25 毫升

使用注射器測量：

2.5 毫升

1.25 毫

2.5 毫升

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

* 與食物一起服用。

* 如果出現脫水情況，請勿使用。

* 請勿與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 可以將這藥物與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器

Formatted: Font: 12 pt

體重：
8 – 10.5 公斤
或者
17.5 – 23.1 磅

布洛芬 (Ibuprofen)
(Motrin)

Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt

你有什麼
藥？

濃縮嬰兒滴劑
1.25 毫升中含 50 毫克
給您孩子的劑量是 80 毫克

小兒藥液
5 毫升中含 100 毫克
給您孩子的劑量是 80 毫克



2 毫升

使用注射器測量：
2 毫升



4 毫升

使用注射器測量：
4 毫升

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

Formatted: Font: 12 pt

* 與食物一起服用。


* 如果出現脫水情況，請勿 使用。

* 請勿 與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

*** 在急診室或藥店索取劑量注射器***



Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 12 pt

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

* 與食物一起服用。

* 如果出現脫水情況，請勿 使用。

* 請勿 與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有對乙醯氨基酚（Tylenol/泰諾）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器

體重：

16 – 20.9 公斤

或者

35.2 – 46.1 磅

布洛芬 (Ibuprofen)
(Motrin)

Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

你有什麼
藥？

Formatted: Font: 14 pt

濃縮嬰兒滴劑

1.25 毫升中含 50 毫克

不建議


小兒藥液

5 毫升中含 100 毫克

給您孩子的劑量是 150 毫克

使用注射器測量：

7.5 毫升



7.5 毫升

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

Formatted: Font: 12 pt

* 與食物一起服用。

* 如果出現脫水情況，請勿 使用。

* 請勿 與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器

體重：

21 – 26.9 公斤

或者

46.2 – 59.3 lbs

布洛芬 (Ibuprofen)
(Motrin)

Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

你有什麼
藥？

Formatted: Font: 14 pt

濃縮嬰兒滴劑

1.25 毫升中含 50毫克

不建議

小兒藥液

5 毫升中含 100 毫克

給您孩子的劑量是 200 毫克

使用注射器測量：

10 毫升



10 毫升

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

Formatted: Font: 12 pt

* 與食物一起服用。


* 如果出現脫水情況，請勿使用。

* 請勿與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 可以將這藥物與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器



Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 12 pt

體重：

32 – 40 公斤

或者

70.4 – 88.2 磅

布洛芬 (Ibuprofen)
(Motrin)

Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

你有什麼
藥？

Formatted: Font: 14 pt

濃縮嬰兒滴劑

1.25 毫升中含 50 毫克

不建議

小兒藥液

5 毫升中含 100 毫克

給您孩子的劑量是 300 毫克

使用注射器測量：

15 毫升



15 毫升

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

Formatted: Font: 12 pt

* 與食物一起服用。


* 如果出現脫水情況，請勿 使用。

* 請勿 與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器



Formatted: Font: 16 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Font: 12 pt

* 可以 每 6 至 8 小時一次。

* 與食物一起服用。

* 如果出現脫水情況，請勿 使用。

* 請勿 與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有對乙醯氨基酚（Tylenol/泰諾）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器