





對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol / 泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 40 毫克



使用注射器測量：
1.25 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol / 泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 80 毫克



使用注射器測量：
2.5 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 120 毫克



使用注射器測量：
3.75 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚 (Tylenol/泰諾) 的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬 (Motrin) 的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 160 毫克



使用注射器測量：
5 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 240 毫克



使用注射器測量：
7.5 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 320 毫克



使用注射器測量：
10 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 400 毫克



使用注射器測量：
12.5 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 480 毫克



使用注射器測量：
15 毫升


* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器




對乙酰氨基酚
(Acetaminophen)
(Tylenol/泰諾)

Formatted: Font: 12 pt

小兒藥液

5 毫升中含 160 毫克
給您孩子的劑量是 640 毫克



使用注射器測量：
20 毫升

* 可以 每 4 至 6 小時一次。

* 請勿 與其他含有對乙酰氨基酚（泰諾/Tylenol）的產品一起服用。

* 可以 將這藥物與其他含有布洛芬（Motrin）的產品一起服用。

* 如果您的孩子長大後體重超出此範圍，請諮詢您的醫生以獲取新劑量。

在急診室或藥店索取劑量注射器